

Tu e PALFORZIA®

Informazioni importanti sulla
sicurezza per il trattamento
con PALFORZIA® ▼
(polvere sgrassata di semi di
Arachis hypogaea L. (arachidi))

▼ Questo medicinale è sottoposto a monitoraggio
addizionale. Ciò permetterà la rapida identificazione
di nuove informazioni sulla sicurezza.

**Opuscolo educativo sulla
sicurezza per i pazienti**

Età 12-17 anni 



Indicazione:

PALFORZIA contiene proteina di arachidi derivata dalla polvere sgrassata di semi di arachidi. È un trattamento per persone che soffrono di allergia alle arachidi (*Arachis hypogaea* L.).

PALFORZIA è indicato nei bambini e adolescenti di età compresa tra 1 e 17 anni e per coloro che raggiungono la maggiore età durante il trattamento.

PALFORZIA agisce nelle persone allergiche alle arachidi aumentando gradualmente la capacità dell'organismo di tollerare piccole quantità. Questo effetto prende il nome di "desensibilizzazione". PALFORZIA può aiutare a ridurre la gravità delle reazioni allergiche in seguito all'esposizione alle arachidi.

PALFORZIA non è efficace contro altre allergie alla frutta a guscio o altre allergie alimentari.

I pazienti che assumono PALFORZIA devono continuare a evitare il consumo di arachidi.

Segnalazione degli effetti indesiderati

▼ Questo medicinale è sottoposto a monitoraggio addizionale. Ciò permetterà la rapida identificazione di nuove informazioni sulla sicurezza. Lei può contribuire segnalando al medico, al farmacista o al personale infermieristico qualsiasi effetto indesiderato che Suo/a figlio/a potrebbe manifestare, compresi potenziali effetti indesiderati non elencati in questo opuscolo. Gli effetti indesiderati possono essere segnalati anche tramite il sistema nazionale di segnalazione all'indirizzo:

<https://www.aifa.gov.it/content/segnalazioni-reazioni-avverse>

Segnalando gli effetti indesiderati, può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di questo medicinale.

Trattamento con PALFORZIA: guida per i pazienti adolescenti

Se sei un/a adolescente allergico/a alle arachidi a cui è stato prescritto PALFORZIA, questa guida è pensata appositamente per te. Mira a rispondere alle tue domande sul trattamento con PALFORZIA..

Questo opuscolo ti fornisce informazioni sui seguenti argomenti:


- Che cos'è PALFORZIA e chi può o non può assumerlo
- Come e quando prendere PALFORZIA
- Effetti indesiderati che potresti manifestare dopo aver assunto PALFORZIA e cosa fare se dovessi manifestarli
- Altre informazioni importanti sulla sicurezza durante l'assunzione di PALFORZIA

Opuscoli e video educazionali

Sono disponibili anche un manuale per i caregiver e una serie di video destinati a te, che contengono informazioni su PALFORZIA. È possibile accedere a queste risorse scansionando il codice QR o visitando il sito **www.stallergenesgreer.com/it/piano-di-gestione-del-rischio-palforzia**

Anche se abbiamo cercato di includere tutte le informazioni di cui potresti aver bisogno su PALFORZIA, non esitare a chiedere al tuo medico eventuali dettagli aggiuntivi sugli argomenti trattati in questo opuscolo. Troverai maggiori informazioni anche nel foglio illustrativo contenuto nella tua confezione di PALFORZIA.

Istruzioni: inquadrare il codice QR con la fotocamera del telefono per aprire il link.



Sommario

-  **Pagina 7** **Sezione 1:** Alcune cose importanti da ricordare
-  **Pagina 14** **Sezione 2:** Informazioni su PALFORZIA
-  **Pagina 16** **Sezione 3:** Possibili effetti indesiderati di PALFORZIA
-  **Pagina 18** **Sezione 4:** Assunzione di PALFORZIA
-  **Pagina 26** **Sezione 5:** Altre informazioni utili

Riepilogo delle informazioni sulla sicurezza

Assicurati di leggere e comprendere le seguenti informazioni e, se dovessi avere delle domande, non esitare a chiedere al tuo medico.

PALFORZIA è un medicinale per il trattamento dell'allergia alle arachidi e, come tutti i medicinali, può avere degli effetti indesiderati.

Questo opuscolo contiene informazioni importanti su come assumere il medicinale in modo sicuro. Tuttavia, prima di entrare nei dettagli, dobbiamo illustrare due potenziali effetti indesiderati che possono verificarsi con PALFORZIA: **anafilassi ed esofagite eosinofila (EoE)**.

Per ridurre al minimo il rischio di una potenziale reazione, è importante che tu sia a conoscenza di quanto segue:

- sintomi a cui prestare attenzione;
- quando contattare il medico o i servizi di emergenza;
- cose importanti da fare e da evitare durante l'assunzione del trattamento.

L'anafilassi è un tipo di reazione allergica che può interessare contemporaneamente diverse parti del corpo. Può essere di grado da lieve a grave e potrebbe comportare un rischio per la vita. Le reazioni possono manifestarsi immediatamente oppure entro alcune ore in seguito al contatto con un allergene. L'anafilassi può includere una combinazione dei seguenti sintomi:

- difficoltà di respirazione;
- senso di costrizione o di pienezza alla gola;
- difficoltà di deglutizione o di parola;
- alterazioni della voce;
- capogiri o svenimento o senso di avversità imminente;
- forti crampi o dolori allo stomaco, vomito o diarrea;
- forte arrossamento o prurito cutaneo.

Se dovessi manifestare una qualsiasi combinazione di questi sintomi e sospetti una reazione di anafilassi, segui il tuo piano di emergenza per l'anafilassi, utilizza l'adrenalina autoiniettabile attenendoti alle istruzioni e contatta i servizi di emergenza.

Se hai domande o dubbi sull'utilizzo dell'adrenalina autoiniettabile, rivolgiti al tuo medico per ricevere istruzioni su come e quando utilizzarla.

L'esofagite eosinofila (EoE) è una malattia in cui un tipo di globuli bianchi (chiamati eosinofili) si accumula nel canale che collega la bocca allo stomaco (esofago).

È stata segnalata da alcune persone affette da allergia alle arachidi che ricevono l'immunoterapia orale.

I sintomi dell'esofagite eosinofila possono includere:

- difficoltà di deglutizione;
- cibo incastrato in gola;
- bruciore nel torace, nella bocca o in gola;
- rigurgito;
- perdita dell'appetito;
- difficoltà nell'alimentazione;
- scarso aumento di peso.

Se dovessi manifestare uno qualsiasi di questi sintomi, contatta il tuo medico, che monitorerà attentamente la tua salute per rilevare eventuali problemi di stomaco. Se il tuo medico sospetta la presenza di EoE, il trattamento con PALFORZIA sarà interrotto.

Altri possibili effetti indesiderati:

Tosse, irritazione alla gola, dolore alla gola e alla bocca, rinite allergica (naso che cola, starnuti, prurito nasale, fastidio al naso), naso chiuso, vomito, dolore addominale, malessere allo stomaco (nausea), prurito alla bocca, formicolio o intorpidimento nella bocca, prurito cutaneo, eruzione cutanea, orticaria.

Cose da fare e cose da evitare

Per ridurre al minimo il rischio di manifestare effetti indesiderati, assicurati di attenerli al seguente elenco di "cose da fare" e "cose da evitare" durante il trattamento con PALFORZIA.

✓ Cose da fare X Cose da evitare



Assumere PALFORZIA ogni giorno.



Assumere PALFORZIA durante un pasto



Assumere PALFORZIA circa alla stessa ora ogni giorno (preferibilmente durante la cena)



Porta sempre con te l'adrenalina autoiniettabile



NON consumare arachidi



NON assumere PALFORZIA in presenza di nausea.



NON assumere PALFORZIA nelle 2 ore prima di andare a letto



NON ingerire la capsula e non inalare la polvere.



NON bere alcol nelle 2 ore precedenti o successive all'assunzione di una dose



NON praticare attività fisica e non fare una doccia o un bagno caldo immediatamente prima o per 3 ore dopo l'assunzione di PALFORZIA.



1

**Alcune cose
importanti
da ricordare**



Non devi **mai mangiare
arachidi o cibi contenenti
arachidi**, anche dopo aver
assunto PALFORZIA.



Devi portare **sempre** con te
l'adrenalina autoiniettabile.





Devi assumere il medicinale **tutti i giorni durante un pasto, circa alla stessa ora ogni giorno** preferibilmente durante la cena



Non devi ingoiare le capsule. Le capsule e le bustine devono essere aperte e la polvere deve essere mescolata con del cibo a cui non sei allergico/a. Il cibo non deve essere né caldo, né troppo liquido

✓ I cibi più indicati comprendono budino di riso, purea di frutta o yogurt.

✗ I cibi con cui non deve essere mescolato comprendono zuppe e frullati.





Assicurati **di non stancarti troppo e non fare attività fisica** immediatamente prima di assumere PALFORZIA o nelle 3 ore successive.



Non devi assumere PALFORZIA se manifesti sintomi di malessere.

X

Non devi fare una doccia o un bagno caldo immediatamente prima di assumere PALFORZIA o nelle 3 ore successive.



X

Non devi assumere **PALFORZIA** nelle 2 ore prima di andare a dormire



Non bere alcol nelle 2 ore precedenti o successive all'assunzione di una dose.



Le mestruazioni possono influenzare il modo in cui l'organismo reagisce a PALFORZIA.

Se dovessi manifestare eventuali sintomi allergici mentre hai il ciclo, assicurati di avvisare il tuo medico in modo che possa modificare la tua dose di PALFORZIA, se necessario.





I farmaci antinfiammatori non steroidei (come l'ibuprofene) possono influenzare il modo in cui l'organismo reagisce a PALFORZIA.

Fai particolare attenzione se assumi questi medicinali.



Ti consigliamo di contattare il tuo medico in uno qualsiasi dei seguenti casi:

- **se contrai un raffreddore o l'influenza;**
- **se la tua asma peggiora;**
- **se ti senti molto stressato/a;**
- **se ti senti insolitamente stanco/a oppure dormi male da diversi giorni.**

2

Informazioni su PALFORZIA

Chi non può assumere PALFORZIA?

PALFORZIA non deve essere mai assunto da persone che:

- presentano asma grave o non controllata;
- hanno o hanno avuto problemi di deglutizione o problemi di lunga durata all'apparato digerente, incluse esofagite eosinofila (EoE) e malattia da reflusso gastroesofageo (MRGE);
- presentano un'anamnesi o soffrono attualmente di grave disturbo dei mastociti;
- presentano ipersensibilità a uno qualsiasi degli ingredienti inattivi utilizzati per la produzione di PALFORZIA (cellulosa microcristallina, amido di mais parzialmente pregelatinizzato, silice colloidale anidra, magnesio stearato);
- hanno manifestato anafilassi grave o potenzialmente letale nei 60 giorni precedenti l'inizio del trattamento con PALFORZIA.

Se hai dei dubbi oppure non hai mai sentito parlare di una qualsiasi di queste condizioni, rivolgiti al tuo medico, il quale saprà fornirti maggiori informazioni al riguardo.

Soffro ancora di allergia alle arachidi durante l'assunzione di PALFORZIA?

Sì, soffri ancora di allergia alle arachidi, anche se potresti non avere una reazione allergica se dovessi mangiare accidentalmente un'arachide. PALFORZIA mira a desensibilizzare il tuo sistema immunitario alle arachidi, ma non è una cura per l'allergia alle arachidi.

È molto importante che continui ad assumere PALFORZIA ogni giorno per mantenere la desensibilizzazione, che continui a evitare il consumo di arachidi e che porti sempre con te l'adrenalina.

Per quanto tempo devo assumere PALFORZIA?

È necessario assumere PALFORZIA ogni giorno per il mantenimento degli effetti e della tollerabilità.

I dati attualmente disponibili si riferiscono a un periodo di trattamento con PALFORZIA fino a 24 mesi.



Da ricordare:

Dovrai continuare a evitare il consumo di arachidi, anche dopo aver assunto PALFORZIA.

3 Possibili effetti indesiderati di PALFORZIA

Effetti indesiderati di PALFORZIA

Come tutti i medicinali, PALFORZIA può causare effetti indesiderati, anche se non tutte le persone li manifestano.

Questi effetti si verificano poiché il meccanismo di azione di PALFORZIA si basa sull'esposizione intenzionale alla proteina di arachidi. In base alle prove ottenute dagli studi clinici su PALFORZIA, ci si devono aspettare delle reazioni allergiche, ma la maggior parte dovrebbe essere lieve o moderata e accadono meno spesso con il tempo.

Gli effetti indesiderati importanti includono:

- **difficoltà di respirazione;**
- **senso di costrizione o di pienezza alla gola;**
- **difficoltà di deglutizione o di parola;**
- **alterazioni della voce;**
- **capogiri o svenimento o percezione di un pericolo imminente;**
- **capogiri o svenimento;**
- **forti crampi o dolori allo stomaco, vomito o diarrea;**
- **forte arrossamento o prurito cutaneo.**

Il tuo medico illustrerà più dettagliatamente questi sintomi a te e ai tuoi genitori o al tuo caregiver, per aiutarvi a riconoscerli più facilmente e a sapere quali misure adottare se dovessi manifestarli. Dovrai informare il tuo medico se dovessi manifestare uno qualsiasi di questi sintomi.

Anafilassi

PALFORZIA può provocare reazioni allergiche gravi e potenzialmente letali. I sintomi di reazioni allergiche a PALFORZIA possono includere:

- difficoltà di respirazione;
- senso di costrizione alla gola o senso di pienezza alla gola;
- difficoltà di deglutizione o di parola;
- capogiri o svenimento o percezione di un pericolo imminente;
- forti crampi o dolori allo stomaco, vomito o diarrea;
- forte arrossamento o prurito cutaneo.

Se dovessi manifestare uno qualsiasi di questi sintomi, smetti di assumere PALFORZIA, tratta

la reazione seguendo le istruzioni che hai precedentemente ricevuto dal tuo medico e richiedi **immediatamente** assistenza medica. Queste reazioni possono verificarsi immediatamente dopo aver assunto il farmaco o nel giro di alcune ore.

Esofagite eosinofila

PALFORZIA può causare sintomi gastrointestinali, incluso un problema all'esofago chiamato esofagite eosinofila. I sintomi dell'esofagite eosinofila possono includere:

- difficoltà di deglutizione;
- cibo incastrato in gola;
- rigurgito;
- difficoltà nell'alimentazione;
- scarso aumento di peso;
- perdita di appetito;

Se dovessi manifestare questi sintomi in modo persistente, consulta un medico.

Se dovessi manifestare uno qualsiasi dei seguenti sintomi, utilizza la tua adrenalina autoiniettabile e richiedi immediatamente assistenza medica:

- **difficoltà di respirazione;**
- **senso di costrizione alla gola o senso di pienezza alla gola;**
- **difficoltà di deglutizione;**
- **alterazioni della voce;**
- **capogiri o svenimento o percezione di un pericolo imminente**
- **forti crampi o dolori allo stomaco, vomito o diarrea;**
- **forte arrossamento o prurito cutaneo;**
- **peggioramento dell'asma o di qualsiasi altro problema respiratorio;**
- **bruciore di stomaco, difficoltà di deglutizione, dolore durante la deglutizione o forte dolore nel torace che non passa oppure peggiora.**

Il tuo medico spiegherà a te e ai tuoi genitori o al tuo caregiver come riconoscere questi sintomi e cosa fare se dovessero manifestarsi.


4 Assunzione di PALFORZIA

Le tre fasi del trattamento

Dopo che il tuo medico avrà stabilito che puoi iniziare ad assumere PALFORZIA, inizierà la prima delle 3 fasi di somministrazione previste. In questo modo, il medico potrà aumentare gradualmente la dose di medicinale che assumerai nel corso del tempo. A volte potrebbe esserti chiesto di continuare ad assumere la stessa dose per un periodo più lungo, di ridurre la dose o di interrompere completamente la somministrazione. Il tuo medico sarà in grado di indicarti quando ciò potrebbe essere necessario.

Per la fase 1, riceverai PALFORZIA in capsule.
Per la fase 2, PALFORZIA sarà fornito sotto

forma di capsule fino all'ultimo livello di dose, che sarà sotto forma di bustina. Per la fase 3, riceverai PALFORZIA sotto forma di bustina. In tutte le fasi, dovrai svuotare le capsule o le bustine di PALFORZIA e mescolarne il contenuto con del cibo per poterlo ingerire.



Fase 1 (2 giorni)

Quando inizierai ad assumere PALFORZIA, dovrai andare dal medico per 2 giorni di fila.

Giorno 1

1. Se sei abbastanza in salute per iniziare il trattamento, riceverai **1 dose di PALFORZIA ogni 30 minuti** presso la clinica sotto supervisione medica, fino a quando non avrai assunto **5 dosi**.
2. Se durante questa fase insorgono eventuali sintomi che richiedono un intervento medico (ad es. l'uso di adrenalina), il trattamento sarà interrotto.
3. All'inizio le dosi saranno molto piccole e in seguito verranno gradualmente aumentate. Dopo aver assunto ogni dose, il medico controllerà il tuo stato di salute per verificare che tu stia bene.
4. Dopo l'assunzione della dose numero 5, dovrai rimanere presso la clinica per almeno 60 minuti prima di poter tornare a casa, in modo che il medico possa assicurarsi che tu stia bene.
5. Se tollererai la dose numero 4 ma non la dose numero 5, potrai proseguire il trattamento, ma dovrai tornare presso la clinica prima di iniziare la fase 2 del trattamento

Giorno 2

1. Il medico effettuerà alcuni controlli del tuo stato di salute e ti chiederà come ti sei sentito/a dopo il tuo ritorno a casa il giorno precedente. Se non hai manifestato malessere e gli esami si sono conclusi con risultati positivi, il medico ti darà 1 dose di PALFORZIA e controllerà che tu stia bene.
2. Se la dose viene tollerata, tornerai a casa con una scorta di questa dose di PALFORZIA, che sarà sufficiente per 2 settimane.
3. Per le successive 2 settimane, dovrai assumere PALFORZIA a casa, una volta al giorno durante un pasto.

Da ricordare: quando assumi PALFORZIA a casa, dovrai seguire le istruzioni (riportate a pagina 22). Se dovessi sentirti male o avere una reazione allergica in qualsiasi momento, informa i tuoi genitori e/o il tuo medico.

≡ Fase 2 (circa 6 mesi)

- Dopo 2 settimane, tornerai presso la clinica per ricevere una nuova dose di PALFORZIA, che sarà leggermente superiore a quella precedente.
- **Non dovrai assumere la tua dose di PALFORZIA a casa nei giorni in cui devi recarti dal medico.**
- Se il tuo trattamento procede bene, il medico ti darà una nuova dose con una concentrazione superiore e rimarrai in clinica per almeno 60 minuti prima di poter tornare a casa.
- A casa, dovrai assumere PALFORZIA circa alla stessa ora ogni giorno. Dopo 2 settimane, tornerai dal medico e, se le cose stanno andando bene, riceverai una nuova dose leggermente superiore a quella precedente.
- Dovrai ripetere questo processo, ovvero assumere la dose giornaliera a casa e poi tornare dal medico, per circa 6 mesi poiché la tua dose di PALFORZIA deve essere aumentata da 3 mg (circa l'1% della proteina contenuta in un nocciolo di arachide) fino a 300 mg (circa la stessa quantità di proteina contenuta in un nocciolo di arachide) al giorno nell'arco di 11 livelli di dose.
- A volte, il tuo medico potrebbe prescriverti una dose inferiore o chiederti di assumere la

stessa dose per un periodo più lungo se dovessi manifestare effetti indesiderati. In questo modo il tuo organismo si “abituerà” al livello di dose. Il tuo medico ti fornirà spiegazioni al riguardo se ciò dovesse verificarsi.

- Il tuo medico si assicurerà che tu possieda la giusta dose di PALFORZIA da assumere ogni giorno a casa, fino alla visita successiva.



≡ Fase 3

- Quando potrai assumere in modo sicuro la dose giornaliera da 300 mg, avrai raggiunto la fase 3. Questa fase prende il nome di fase di mantenimento.
- **Come per le fasi precedenti, non dovrai assumere la tua dose abituale di PALFORZIA a casa il giorno in cui dovrai recarti dal medico.**
- Riceverai una confezione contenente una scorta di bustine da 300 mg di PALFORZIA da portare a casa, che sarà sufficiente per un mese. **Consulta pagina 22** per istruzioni su come mescolare PALFORZIA con il cibo.
- Durante la fase di mantenimento del trattamento, il tuo medico confermerà con quale frequenza dovrai presentarti a una visita di controllo.

300 mg



Da ricordare:



- Dovrai continuare ad assumere PALFORZIA ogni giorno affinché il trattamento sia efficace.



- Fai particolare attenzione per circa 1 ora dopo aver assunto la dose e assicurati che sia presente un adulto nelle vicinanze, in modo che possa aiutarti se dovessi manifestare sintomi di una reazione allergica..



- Dovrai continuare a fare molta attenzione a non mangiare arachidi o cibi contenenti arachidi.



- Dovrai continuare a portare sempre con te l'adrenalina autoiniettabile.

Come mescolare PALFORZIA con il cibo

- 1** PALFORZIA sarà fornito in capsule o in bustina, a seconda del livello di dose (capsula/e fino a 240 mg e una bustina per la dose da 300 mg). Ogni capsula o bustina contiene una polvere che tu o i tuoi genitori dovreste mescolare con una piccola quantità di cibo morbido a cui non sei allergico/a e che non sia né caldo, né troppo liquido (yogurt, budino di riso o purea di frutta sono dei buoni esempi).
- 2** Assicurati di non mescolare PALFORZIA con una quantità eccessiva di cibo, in modo da poter ingerire la dose completa in poche cucchiainate, e non riscaldare il cibo.
- 3** Estrai dalla confezione la tua dose giornaliera totale di PALFORZIA. Quando utilizzi le capsule, la tua dose giornaliera sarà contenuta in un singolo blister all'interno della confezione e potrà essere costituita da una sola capsula o da diverse capsule, a seconda della dose da assumere. Quando utilizzi le bustine, una bustina corrisponderà alla tua dose giornaliera totale.
- 4** Se utilizzi le capsule, apri ogni capsula con un movimento rotatorio e spargi la polvere sopra il cibo. Se utilizzi una bustina, tienila sopra il cibo e taglia la parte superiore della bustina con un paio di forbici.
- 5** Svuota l'intero contenuto delle capsule o della bustina nel piatto contenente il cibo.

6

Mescola la polvere nel cibo fino a quando non è completamente mescolato senza grumi.

7

Getta la bustina o le capsule vuote nel cestino della spazzatura.

8

Assicurati di assumere la quantità totale di ogni dose giornaliera

9

La miscela contenente le dosi di PALFORZIA e il cibo può essere preparata e conservata in frigorifero fino a 8 ore.

10

Se non assumi la dose entro 8 ore dal momento della preparazione, gettala via e prepara una nuova miscela.

11

Lavati immediatamente le mani dopo aver manipolato le capsule o le bustine di PALFORZIA.

Informazioni sulle dosi di PALFORZIA

La fase di somministrazione 2 (somministrazione a dosi crescenti) di PALFORZIA è suddivisa in 11 livelli.

A ogni livello, la dose giornaliera di PALFORZIA sarà aumentata leggermente.

Per i primi 10 livelli, le dosi sono fornite in capsule di forme, dimensioni e colori variabili, che sono raggruppate in blister separati. Al livello 11, e durante la fase di mantenimento, la dose giornaliera viene fornita in una bustina.

Le immagini mostrano quale aspetto avranno le capsule e la bustina in ogni livello della somministrazione a dosi crescenti.

È importante annotare il numero di lotto di PALFORZIA. Ogni volta che riceverai una nuova confezione di PALFORZIA, tu oppure i tuoi genitori o il tuo caregiver dovete prendere nota della data e del numero di lotto (che è riportato sulla confezione accanto alla dicitura "Lotto") e conservare queste informazioni in un luogo sicuro.

Livello 1

(dose giornaliera da 3 mg)



Livello 2

(dose giornaliera da 6 mg)



Livello 3

(dose giornaliera da 12 mg)



Livello 4

(dose giornaliera da 20 mg)



Livello 5

(dose giornaliera da 40 mg)



Livello 9

(dose giornaliera da 200 mg)



Livello 6

(dose giornaliera da 80 mg)



Livello 10

(dose giornaliera da 240 mg)



Livello 7

(dose giornaliera da 120 mg)



Livello 11

(dose giornaliera da 300 mg)



Livello 8

(dose giornaliera da 160 mg)



5

Altre informazioni utili

Dove bisogna conservare PALFORZIA?

Dovrai conservare PALFORZIA in un'area della casa con una temperatura ambiente non superiore a 25 °C. Questo significa che dovrai tenerlo in un punto della casa con una temperatura moderata, al riparo dalla luce diretta del sole. Un armadietto fresco e buio potrebbe essere il luogo migliore.

Come devo utilizzare la scheda paziente che ho ricevuto con PALFORZIA?

Riceverai una scheda paziente che servirà a informare altre persone che stai assumendo PALFORZIA. Dovrai inserire i tuoi dati su questa scheda e assicurarti di mostrarla a un medico, un infermiere o un paramedico se dovessi andare dal medico oppure in ospedale.



Che cosa succederà con altre malattie allergiche di cui potrei soffrire (ad es. asma, allergia ai pollini, eczema, altre allergie alimentari)?

Le altre allergie devono continuare a essere adeguatamente gestite. Se prendi dei medicinali per queste allergie (inalatori, creme o pillole), dovrai continuare a utilizzarli.

I tuoi genitori o il tuo caregiver decideranno se è opportuno per te saltare la dose di PALFORZIA in un dato giorno e verificare come ti senti il giorno seguente. Tu oppure i tuoi genitori o il tuo caregiver dovreste contattare il tuo medico in caso di domande.

PALFORZIA e la gravidanza

Non iniziare ad assumere PALFORZIA se sei incinta o se stai pianificando una gravidanza. Se sei incinta o stai allattando al seno, oppure se sospetti o stai pianificando una gravidanza, chiedi consiglio al tuo medico prima di assumere questo medicinale.

PALFORZIA e il consumo di alcol

Bere alcolici o assumere medicinali contenenti alcol può aumentare la probabilità di una reazione allergica dopo l'assunzione di PALFORZIA.

Dosi inutilizzate

Quando il tuo medico ti dirà che un livello della somministrazione a dosi crescenti è stato completato, dovrai gettare via tutte le dosi rimanenti (capsule o bustine) all'interno di quella confezione prima di iniziare un nuovo livello di dose. Queste includono eventuali dosi extra che non hai utilizzato all'interno di ogni confezione.



Recapiti

Stallergenes Italia S.r.l.

Via Gadames, 57/7

20151, Milano

Italia

Telefono: +39 (0)2.334541

Informazioni mediche e segnalazioni relative alla sicurezza

E-mail: medinfo-eu@stallergenesgreer.com

Telefono: 800 931 497

